


ПРО ПЛЕКАННЯ І ЛІЧЕННЯ

ДОМАШНІХ ЗВІРЯТ

ПРАКТИЧНИЙ ПОРАДНИК.



Л Ъ В І В 1930

В-В О „Р У С А Л К А“

636
P9452

Що треба знати, купуючи коні.

Купувати коні, особливо у ліверантів, треба з великою обережністю, бо ніде так не можна помилитися, як на купівлі коней. Мета всякого ліверанта затуманити голову покупцеві і сховати той брак, який є в коня. Для того часто — густо вони підроблюють зубні коронки, щоби сховати справжній вік коня, виривають їм молочні зуби і пускаються на інші хитрощі. Отже, щоби купити доброго коня і не стати жертвою ошуканства кінських спекулянтів, треба знати, на що звертається увага підчас купівлі коней.

Губи. Оглядаючи губи в коней, звертають увагу на те, чи не висить долішня губа, як це буває в старих коней. У молодих коней губи обвисають лише тоді, коли вона слаба на параліж: така коняка набирає корм з великими труднощами, через що буває завжди голодна, худа і слаба. Потім треба обдивитися уважно куточки губ. У норовистих коней бувають там задри, а іноді й надірвана шкіра. Ліверанти, продаючи коня, силкуються запевнити, що ці задри в коня від того, що він випадково поранив себе. Не вірте цьому. Не зайвим буде також подивитися на свищі в яснах і по куточках рота, які свідчать про слабування зубів.

Язик. Завжди треба уважно оглядати весь ріт, язик і зуби, бо тут ліверанти найбільше шахрують. У багатьох коней на язиці бувають ранки від довгого споживання половини і поганого догляду за ними. Трапляються навіть коні з відірваними язиками; це свідчить про те, що кінь непокірний і його загнуждували мотуззяними поводками. Щоби сховати цей брак, ліверанти так налякують коней або мастять їм рота чимсь так пекучим, що годі буває примусити коня роззявити рота. Деякі ліверанти, коли покупець хоче оглянути рота, так зручно хапають коня за язик, що покупець нічого там не побачить; до того-ж ліверант звертає під цей час увагу покупця на зуби, або на щось інше, щоби не дати можливості запримітити хорого язика. Треба подивитися також, чи нема ранок у коняки в роті від гострих кутніх зубів. Цей брак ліверанти справляють надпилюванням зубів.

Зуби. Ніде так не ошукують ліверанти покупців, як на зубах. Тут молоду коняку вони роблять старою, а стару молодію, аби позбутися коня і взяти за нього більше. Щоб уміти вибрати коня потрібного віку, треба знати, як вгадуєть-

вгадується вік коня по зубах. Вік коня пізнається по стиранню й по формі зубів.

У коней, як і в інших тварин, бувають молочні зуби, які в свій час випадають і замінюються сталими, постійними зубами. Молочні зуби своєю формою й кольором різняться від постійних зубів: молочні зуби мають форму лопатки, а сталі зуби форму долота і темніші від молочних. Вік коня до 5 літ пізнається головним чином по зміні і стиранню передніх зубів, які звуться сікачами.

Дорослий кінь має 40 зубів: 6 горішніх і 6 долішніх сікачів, 2 горішніх і 2 долішніх кли (у кобил їх нема), 12 (иноді 14) горішніх і 12 (дуже рідко 14) спідніх кутніх зубів або череняків. Зуби як у горішньому, так і в долішньому щелепах (по галицьки: щоках) сидять так: $6 + 1 + 6 + 1 + 6$. Всі ці зуби з'являються на місце молочних зубів, крім іклів (клів), які у лошат не прорізуються.

Сікачі у коней звуться так: 2 передніх — зачепами, 2 суміжних з іклами — окрайцями, 2 сікачі, що знаходяться між зачепами й окрайцями — середниками. Таким чином сікачі (як горішні, так і долішні) уявляють таку низку: окраєць + середник + зачеп + зачеп + середник + окраєць.

Кутні зуби або череняки діляться на 1) ближчі, змінні череняки, які міняються, і на 2) суто кутні, задні постійні череняки, які не міняються. Змінні череняки рахуються ззаду наперед: 1-й, 2-й, 3-й, (иноді 4-й*). Постійні череняки рахуються навпаки—спереду взад (1,2,3). Таким чином череняки, як горішні, так і спідні, уявляють таку низку: (4-й ближчий) + 3-й ближчий + 2-й ближчий + 1-й ближчий + 1-й задній + 2-й задній + 3-й задній.

Після 5 літ вік коней пізнається по стиранню коронок.

Лошата родяться без зубів; через два тижні в них вирастають зачепи, через 4 тижні — середники, а окрайці прорізуються на 9 місяці.

1-й рік — Наприкінці першого року у лошати вже є всі молочні сікачі; зачепи стерті; у середників починає стиратися передня стінка; окрайці вирівнюються.

1½ року. — На зачепах коронки нема; у середників коронка глибока; краєчки окрайців затуплюються.

2 роки. — На зачепах і середниках коронки зникли, а залишаються лише на окрайцях.

2½ року. З'являються постійні зачепи спідні, а потім і вгорі. Прорізуються 2-гі задні череняки.

*) У багатьох коней вже за молодого віку вгорі перед кутніми зубами часто буває стійкоподібний зуб, який не змінюється і звється „вовчим“. Маленький вовчий зуб иноді буває й на долішньому щелепі (щоді). Вовчий зуб прорізується на 3—6 місяці в лошати і не випадає.

3 роки. — Сталі зачепи вирівнюються і починають стиратися. Замінюється молочний передній череняк на сталий (між $2\frac{1}{2}$ — 3 роками.)

$3\frac{1}{2}$ року. — Міняються молочні середники на сталі. В зачехах починає стиратися передня стінка. Змінюється 2-й ближчий череняк на стало (від $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ літ).

4 роки. Середники вирівнюються і починають стиратися. Прорізуються (від $3\frac{1}{2}$ — 4 літ) треті задні череняки. Змінюються настало останні передні череняки.

$4\frac{1}{2}$ року. — Змінюються молочні крайці на сталі; у жеребців в горішньому щелепі прорізуються кли до (5 літ).

5 років. — Вирівнюються крайці і стирається їхня задня стінка.

Значить, коні в 5 літ мають всі сталі (постійні) зуби.

6 літ. — Коронки стираються на зачехах долішніх.

7 літ. — На зачехах коронки стерті і починають стиратися коронки на середниках долішніх.

8 літ. — Всі корони стерті на долішніх сікачах.

Від 8 до 12 літ коронки стираються також на горішніх сікачах і зуби робляться овальної (закругленої) форми. Крім того на крайцях горішніх з'являється бирізка між 9 і 12 роками. Отже:

9 літ. — Коронки стерті на горішніх зачехах; спідні зачепи — закругленої форми.

10 літ. — Коронки стерті на горішніх середниках; спідні середники — закруглені.

11 літ. — Коронки стерті на горішніх крайцях; спідні крайці — закруглені.

12 літ. — Спідні крайці починають вирівнюватися (центральна емаль зникає).

13 років. — Всі долішні сікачі і горішні крайці вирівнялися.

14 років. — Зачепи робляться трохкутньої форми.

15 років. — Середники робляться трохкутньої форми.

16 — 18 літ. — Крайці приймають 3 кутню форму, горішні зачепи і середники вирівнюються.

18 — 20 літ. — Зачепи, середники й крайці приймають послідовно вогнуто-овальну форму.

До всього цього треба додати, що, починаючи з 10 літ, сікачі мають напрям наперед і щороку збільшуються, через що на старість у коней щелепи бувають схожі на щелепи шуки. Взагалі, чим коні старіші, тим тяжче дізнатися про їхній вік по зубах.

Сікачі що року стираються на два міліметри і на стільки ж виходять зі звоїх ямочок. По цьому також можна обчислити вік коня.

Дуже часто ліверанти коней 8 — 9 літніх продають за 5 літніх, видовбуючи коронки на всіх сікачах долішніх або,

підробивши коронки на середниках і окрайцях, продають коня за 6 літнього. Для фальшування коронок вони їх видовбують, а потім припікають розпеченим дротом або припікають смолою, а потім розпеченим дротом. Такого фальшу ніколи не пізнає той, хто не уважно загляне коневі до рота. Натуральні коронки завжди мають краєчки гладенькі рівні й обведені тоненьким віночком з блискучої емалі; підроблені ж коронки мають краєчки нерівні, немов обідені. Крім того, треба уважати й на горішні щелепи. Нарешті треба пам'ятати, що у 8-літнього коня міняються і форма і напрям зубів.

Коли коронки сфальшовані дуже грубо, то для того, щоби не дати покупцеві можливості роздивитися уважно рота, ліверанти натирають ясна коневі сіллю й перцем, які дають дуже велику кількість слини й піни в роті, через що годі буває щось роздивитися; до того ж і кінь робиться дуже неспокійним. Деякі ліверанти фальшують і молодих коней, наприклад 2 пів і — 3 літки підроблюють під 4-літні, для чого виривають за 8 місяців до продажу молочні зачепи. Але уважливо роздивившись, можна цей фальш викрити.

Треба ще додати, що у де-яких коней на долішніх і горішніх сікачах бувають стерті поверхні попереку зуби. Такі коні мають дуже не добру звичку упиратися зубами в ясла, вигибати шию і хапати повітря, немов икаючи. Коні з цим браком завжди худі, перебирають корм й продаються по дуже низьких цінах. Обдивившись таким чином голову коня, оглядають після цього інші частини його тіла.

Як треба поводитися з кіньми.

„Блажен муж, іже і скоти милує“.

1. Найбільше в світі є любов. Поводься з конем любовно і цю любов по всякчас виявляй на ділі. Коли любиш, то годуй і доглядай коня.

2. Лошат-сосунців треба тримати під маткою не менше як 10 місяців. Молоко матери призначене для лошади природою, краще від цього нічого не вигадаєш.

3. Годувати коней треба кормом, який призначено од Бога, себ-то сіном і вівсом, а не покіддю від їхнього корму — соломою. Солома існує лише на підстелення.

4. Коня по паші чи по роботі щоденно чистити, починаючи з лошачого віку аж до старости. Треба пам'ятати, що чистка — половина корму.

5. Поїти коней живою водою з криниць чи студнів. Стави — для купання коней.

6. В холодну пору тримати коня в теплих стайнях і на свіжій підстильці. Стайню провітрювати. Гній для коня так само неприємний, як для людини його власні відходи. Свіже повітря також необхідне, як і корм.

7. Пускати в роботу коня не раніш 4 літ од роду і не виснажувати його роботою. Коні молодші від 4 літ — ще діти, а дітей треба берегти, щоби увійшли в силу. Орати і боронувати (волочити) на однолітках і 2-х літках — злочин і гріх.

8. Господарь мусить любити коня, свого товариша по праці і робітника в господарстві. Не буде в господаря доброго коня, не буде й добробуту в господарстві.

Годівля коров.

Народна пословиця говорить: Який батько, такий син, — який явір, такий клин. Це правило — має примінення і при худобі. Щоби доховатися молочних коров і добрих до роботи волів, треба перш за все подбати, щоб бугай при виборі до плоду був расовий та перш за все, щоб був у відповідному віці. Найлучші до злучки є бугаї від 18 місяців до 3-го року. Відтак бугай повинен бути лагідного, а не дикого успіблення, голова сухошава, а не велика, роги короткі, грубі; кругле черево, широкі ребра, ноги жилисті (не м'ясисті).

Корова не має бути дуже товста, навіть лучше, як буде трохи худшава. Голова і писок середні (не великі), очі веселі, спокійні, шия груба, боки випуклі, ребра широкі і густі, хвіст довгий, зад ширший від переду. Вим'я гладке без гудзів, без шерsti. Коли шкіра на вимени так груба, що трудно зловити пальцями, то корова скупа на молоко. Молочна корова має широкий зад а задні ноги вище передніх.

Купуючи корову треба бути дуже осторожним! Перш за все треба собі уявити, що добру корову мало хто продає. На торгах продаються переважно корови, які не є молочні, або які мають певні блуди. Рідко коли стрінеш на торзі добру корову, бо наш селянин лише в крайній потребі позбувається своєї „кормилиці“. Добру корову можна купити лише по знайомості, — або у спеціальних годювців, які займаються розплодом і годівлею расової худоби.

Коли корова тільна — треба її добре кормити, а на 5—6 неділь перед породом перестати її доїти, щоби телятко зміцнити. Коли тільну корову зле годуем, коли вона їсть стухле сіно, або гнилі овочі, або занадто багато сирої бараболі, то дуже часто внаслідок цього корова недоношує свій плід і ронить.

Коли місце по телятку не вийде з корови зараз по родах, то треба дати корові (влити в горло) відвар з пива, дають

теж цибулю одну-дві (втискають сиру цибулю в горло, щоб корова проглотила), а опріч того дати теплого молока з олієм.

По отеленню давати корові легко стравний корм, тепле пійло, а перш за все додавати сіль і муку до корму.

Дещо про годівлю телят.

Новонароджене телятко корова облизує, для того деякі селяне обсипують теля солею або отрубамі; цього не треба робити, бо корова у своїй жадности до соли може своїм язиком здерти шкіру у теляти.

Молоко у корови після родів є густе, жовтаве і несмачне, тому не треба його видоювати, а дати телятку виссати. Не треба за скоро відлучувати телятко від цицьки, бо хочби найлегче пійло є для телятка тяжким кормом. Чим довше теля ссе, тим воно краще розвивається.

Коли ми за скоро відлучуєм теля від вимени матери, то воно від тяжкого корму хорує, дістає вздуття і тому часто буває так, що господар хоч нехоч мусить теля дорізати, або на гвалт продає.

В таких випадках треба ратувати телят в той спосіб: з ложки товченої крейди розвести в бутілці води і дати телятку випити (влити в горло), а відтак обмити теля зимною водою. Добре теж дати на 2 склянки олію одну склянку дріжжей і давати телятку, аж наступить розвільнення. Коли теля вже прийде до себе, добре є давати щоденно відвар з румянку і полину (по рівній частині з одного і другого зілля) — одну бутилку рано і одну вечером.

Годівля кіз.

Не кождий господар на селі може держати коні, корови та воли; на це можуть дозволити собі лише заможніші. А бідний господар, який має мало ґрунту, або ремісник, чи фабричний робітник, не може здобути навіть на одну корову. Такі люде звичайно дуже бідують без молока, яке особливо для дітей є необхідне. Як що наші малоземельні господарі і безрольні ремісники хочуть зарадити цьому лиху — повинні годувати кози.

В Німеччині годівля кіз дуже розповсюджена. Там не лише бідний селянин має козу, але навіть безземельний фабрикант та ремісник, бо годівля кіз не вимагає великих видатків, а дома є завжди своє молоко. Коза — це дуже скромне а корисне домашнє звірятко, яке буває відпорне на різні хвороби, невибагливе в їді, а дає дуже смачне та здорове молоко. Видатки при годівлі кіз є вдвоє менші, чим при го-

дівлі коров. Те, що потребує одна корова, вистарчить на дві добрі кози. Коли козу добре кормити то дає вона річно до 800 літрів молока; а пересічно дає коза 600 літрів молока.

Годівлею кіз займалися в нас переважно селяне, які живуть в горах але практика показала, що коза рівно добре годується і на долах (в низинних околицях).

Коза походить з Малої Азії, з Персії, звідки дісталась пізніше до різних країв Європи. Є різні раси кіз, з довгим і коротким волоссям різної масти, з рогами і без рогів. Сьгодні найлучшою расою кіз є швайцарська раса; це є кози, які походять з кантону Gaanen у Швайцарії; ця раса відзначається білим, м'яким волосом, без рогів і є особливо розповсюджена в Німеччині.

Які кози найліпші є до годівлі? Перш усього треба вибирати кози одної раси, сильної будови, широкі в грудях і крижах, вимя має бути велике і м'яке, ноги середно високі, волос тонкий та з полиском. Цап має бути здоровий, голова сильна, око ясне і чисте, знаряд половий добре розвинений. Цап, коли є добре годований, може бути вже після одного року уживаний до становлення кіз (а може відстановити 80 — 100 кіз). Час беременности у кіз триває поверх 5 місяців (близько 22 тижні). Коза є дуже плодною звіриною; може видати одно, двоє, а часом і четверо кізлят річно. Коли коза має більше кізлят, як двоє, то при кормленню треба лише двом козлятам давати ссати, а прочі треба кормити окремо молоком, або приставити до такої кози, яка має лише одно козля. Найліпше годуються такі козлята, які роджені в осені.

Як годувати кози? Коза буває дуже лакома на їду. Їсть усе, відпадки ярин, лушпайки бараболь, сухе листя, сіно, морков, капусту, а не чисту воду і помий. Особливо радо їдять кози сушене листя з диких каштанів, ясенів, яворів, вишневих дерев та яблінок. Січку: вівсяну, горохову, ячмінну їсть коза теж з ачетитом, але літом треба необхідно виганяти козу на зелену пашу. Щоби коза ліпше доїлась, дають їй по трохи отруби вівсяні і пшеничні. Час від часу треба додавати до паші соли. Від вики кози трятьть молоко. Зимом треба годувати кози 3 — 4 рази денно; кількість паші більш-менш 1 кильо одноразово. Паша повинна бути чиста, не сплісніла. Наперед давати пашу м'яку, а відтак тверду, після їди поїти чистою водою. Молоді козлята треба поїти молоком 3 — 4 тижні, відтак поволи призвичаювати до звичайної їди.

Приміщення кіз та як їх доглядати? Коза є вражлива на зимно, для того треба її держати у теплій стайні; підстилка (солома або торф) має бути завжди свіжа і суха. Літом, таким виженемо козу на пашу, треба її раніш в стайні підкормити трохи соломою, щоби не переїлась зелениною.

Як дощ, не треба виганяти козу на пашу, бо вражлива на студінь. Кози люблять обгризати зелену кору дерев, длятого не пускати самопас по городах. Дійки кози треба щоденно змивати теплою водою, так само волос часто чесати деревляним гребенем і щіткою. Доїти козу можна три рази денно, подібно як корови. Доглядати треба також ратиці, як за довгі, то обтинати, бо в противному разі калічиться і тоді тратить охоту до їди, та тимсамим зменшує молоко.

Який хосен приносять нам кози? Перш усього коза дає добре, здорове молоко, яке має навіть більше товщу, чим коровяче. З молока робиться сир, який є дуже смачний; на виріб масла козяче молоко не надається. Опріч молока — дає коза що року кілька молодих козлят, які можна далі годувати, або продати. Добре підготовані кози дають знамените м'ясо. Молоді цаци, які не призначені до розплоду, треба скаструвати і тільки тоді підгодувати на заріз. Шкіра кіз надається до виробу рукавичок, обуви, торбинок і знана є в торгівлі під назвою сафіяну.

Господарі, годуйте кози, а будете нам вдячні за добру пораду.

Г. М.

Час злучки і вагітності дом. звірят.

Вік животини, від котрого їх можна припускати до парування: Жеребців од 3 — 5 літ; кобил од 3 — 4 л; бугаїв од 1 і пів — 3 л.; корів од 1 і пів 2 л.; баранів од 1 — 2 і пів л; овець од 1 — 2 і пів л; кнурів од 15 — 18 міс. і свиней од 10 — 18 міс. Менші цифри відносяться до животин, які, раніше розвиваючися, скорше втрачають плодовитість, як що їх пізно парувати; більші цифри відносяться до животин, що розвиваються пізно, особливо, коли не добре годуються. Так, наприклад, молочна худоба і худоба, що призначається на заріз, парується від 1 і пів років, а робоча скотина від 2 і пів — 3 літ. Вівці з грубою вовною і ті, що йдуть на заріз, від 1 і пів л., а шпанки від 2 і пів — 3 літ. Дрібні свині і невеликі свині йоркширської породи йдуть до парування від 10 місячної пори, а буйні йоркшири і місцеві свині — від 15 — 18 місяців.

Вік, до якого скотина може плодитися. Коні простої породи до 15 — 18 років, а благородної до 20, навіть до 30 літ; бугаї звичайні до 7 літ, хоча дуже цінні плідники тримаються навіть до 12 л. Корови — до 12 — 15 літ. Барани плодяться до 4 — 5 л., а вівці до 7 — 8 літ, рідко до 12 л. Кнури служать до 3 — 4 л., свині до 6 і навіть до 10 л. Цап плодиться від 2 — 6 л., а коза від 2 — 8 літнього віку.

Таблиця вагітності господарських животин:

Кобили —	48 і пів тижнів	(від 307 до 412 днів)
Корови —	40 і пів "	(" 240 " 311 ")
Вівці —	22 "	(" 146 " 157 ")
Свині —	16 "	(" 109 " 120 ")

Внутрішні хвороби домашніх звірят.

Кривавий моч у худоби. Часто запепадає худоба на „кривавий моч“, назва походить звідси, що худоба виділяє з себе червоний (часто темно-червоний або аж чорний) моч. При цьому худоба горячкує, тратить апетит, дістає вадуття і затвердіння, або розвільнення, а кал є теж кривавий. Причин цієї хвороби бувають різні. Головною причиною, коли на пасовиську є мало трави, а зголоділа худоба пасе кожду рослину, яка поладеться, то по спожиттю їдевної рослини (молочай, дрібноцвіт, сосонка) худоба дістає кривавий моч. Хвороба ся переходить скоро тоді коли змінимо пасовисько, або коли вигоняєм на пасовисько неголодну худобу. Та часом причиною кривавого мочу є не лише їдевні рослини, але взагалі завадживлювання худоби. Коли худоба їсть спленіле сіно, гнилі буряки, або простудиться — дістає теж кривавий моч.

Щоби хвороба не розвивалась — вастарити часом змилити пасовисько і кривавий моч уступить. Дуже гарно помагає в таких случаях слідуюче лікування: Хову худобу завари-тати в стайні (яка повинна бути завжди суха і чиста) та давати їй що 6 годин по 1 бутилці свіжо видоєного від здорової корови молока. Хвороба уступає по 3—4 бутилках. Після того треба ще одну добу передержати худобу в стайні, на сухому кормі.

Коли хвороба більш вперта і не уступає, треба лічити худобу инакше. Хребет натирати терпентиновим олієм змішаним зі спиртом. Коли у худоби затвердіння запер давати 300—500 грамів глянцєвської соли у відварі льняного семени. При розвільненню давати відповідно до віку худоби 200—500 грамів рицинового олію. (Молодій худобі меншу кількість, старшій — більшу).

Щоби не наражувати худоби на сю хворобу треба постійно за все пам'ятати про те, що вчасною весною треба завжди худобу сухим кормом нагодувати і щойно тоді вигоняти на пасовисько. Худоби в зимних потоках не поїти і не пасти на мляках порослих вільшиною.

Затримання мочу — наступає з простуди. Худоба тривожиться, оглядається поза себе, а моч відходить лише каплями. Рада: натирати мочеви цівку (яка знаходиться між задніми ногами) терпентиновим олієм. Внутрішній лік: Заливати ху-

добину настоем рум'янку або відваром кмину з примішкою горівки. Коли ті способи не допоможуть — вивзати ветеринаря.

Кольки у коней. Хвороба повстає з причини простуди, або переповнення жолудка й кишок надмірним, тяжким кормом, в наслідок чого повстають вітри (гази). Також дістає худоба кольки тоді, коли в кишках витворюються запори, спинаючи природний відхід калу. Також глисти бувають причиною колько у коней. Кінь при кольках перестає їсти, гребе ногами, вертить хвостом, оглядається на живіт, кладеться на землю горі ногами то знова встає, віддих приспінений, при чому звірина потіється.

Лікування при кольках є різне, залежно від причини хвороби.

В початках хвороби дається загально щось на прочищення, напр.: Tartari stibiatі 2—10 грамів розчиняється в пів літри води і вливається коневі в рот (горло). Або: Tartari subiatі 2—6 грамів, $\frac{1}{2}$ —3 ложки води, 300—400 грам. соли глянберської і трішки муки — виліпити пігулки і давати зажити нараз. Коли нема під рукою повищого ліку, то дається лише глянберську сіль, або заливається коня рициновим олієм (300—600 грамів). Якщо причиною кольки було переповнення шлунка, або глисти, то робиться коневі клістиру в слід спосіб: Помастивши руку маслом або милом — вкладається її в відходову кишку, обережно, щоб нігтями не поранити слизову оболонку, — і випорожнюється кишка з калу. Опісля робиться що година коневі клістири з холодної води з примішкою мила або соли. Вливається 10—15 літрів води нараз. По кожній такій клістирі водиться тепло окритого коцями коня — повільним кроком на прохід. По проході натирається коня віхтями і знова робиться клістири так довго, доки не уступлять кольки і запір. (Клістири робитися так: В аптеці або дрогуерії купується шприцу (або ірригатор) і тою шприцою вливається у відходову кишку худоби воду зимну чи теплу, або взагалі плин, який в разі випадку потрібно).

Натирання коней віхтями і приміщення в теплий сухий стайні, та клістири — це при кольках необхідні ради. Треба лише не допускати до цього, щоби кінь кидався силою на землю до гори ногами. Внутрішній лік на кольки: відвар кмину з примішкою горівки, або настій рум'янку. При корчев'ї кольки кінь мусить оставати в теплий стайні і має бути тепло окритий коцями.

При вітряній кольці треба так поступати: Поливати коня зимною водою і натирається вздутий живіт віхтями соломі. По натиранню водити коня (тепло окритого коцями) вільним кроком по дворі. Коли вздуття є грізне — то одиноким ліком є трокар. Є це маленька металева рурка в котру входить гострозакінчений штилет. Цей штилет з руркою ви-

вається в бік худоби в середині між клубом а останнім ребром в напрямку коліна протилежної передної ноги - по рукояті. Опісля придержуючи рурку на своєму місці—витягається штилет—і гази виходять цією руркою. Щоби рурка не вискочила з ранки—прив'язується її довкруг живота і лишається на місці (в рані) так довго, доки виходять гази. Коли вже гази уйдуть, витягається рурку, рану обмивається карболовою водою і заліплюється плястром. Операція така не є страшна і вона не одній худобині виратувала життя.

Кольки у рогатой худоби—повстають з тих самих причин, що у коней, лише перехід хвороби є легчий. Лічення кольки у рог. худоби відбувається так само як у коней. Коли пов. спосіб не помагає—треба візвати ветеринаря. Ознакою поліпшення в хворобі є пережування. Коли корова, яка підчас хвороби мало їсть і не пережуває, — починає раптом пережувати, то це знак, що стан здоров'я поліпшився.

Запалення жолудка і кишок у худоби повстає звичайно в наслідок зіпсутого корму. Також по сильній простуді або по спожиттю замерзлого корму, або за горячого пійла. Кожда колька кінчиться більшим або меншим катаром жолудка і кишок, а катар може перейти в запалення. Обяви хвороби такі: Худоба перестає їсти. Оболони слизові рота зачервонілі, сухі і гарячі. Худоба має спрагу (хоче пити). Коли легко потиснути живіт—худоба відчуває біль. В животі не чути гуркотання. Худоба змагається віддати кал і не може, лише часом при сильнім напруженні відійде мала грудка твердого, слизюм і кровю обведеного калу. Горячка підноситься до 41 степенів, серце сильно бється. Відтак наступає розвільнення і скоро смерть. Коли причиною хвороби був зіпсутий корм—тече худобі слина з рота, животина заточується, паде з ніг, скрегоче зубами. Часто показується опухоль пащі і голови. Хвороба небезпечна, тягнеться часом 3 дні або і довше. Спосіб лічення: Живіт натирається терпентиновим олієм змішаним на половину з горілки або камфоровим спиртом. Ноги обвинувати флянцелевими бандажами.

Внутрішню заливається худобу — рициновим олієм (400—500 грамів) в добре процідженім відварі ячмечю або льняного сімени, лише не все зразу, а в двох давках що пів години. Як нема рицинового олійку, то у відварі з ячменю розчиняється фунт г'явберської соли. (Самого відвару береться півтора літра). Коням дається Calomel — 2 до 5 грамів, відповідно до віку коня, старшому більше, молодшому менше.

Цей лік розчиняється в пів літри відвару льняного сімени і вливається коневі нараз. Коли хора худобина дуже обезсилена, дається також — з тим відваром пів стаканчика горілки або ще лучше чорної кави.

Вода до пиття має бути літня і небагато давати пити. Коли худоба дістає апетит, треба якийсь час не давати нічо

їсти, а потім поволи давати м'який корм, легко стравний та слідкувати, щоб худоба не зіла зіпсованого корму.

Колька у свиней. Причини хвороби ті самі, що у рогатої худоби і коней. Свиня гербиться, лягає, їстає, простягається то корчиться і з болю стогне, а часом квичить. Немає апетиту і їстає затвердіння. Лічення таке саме як при рогатій худобі. Клістири що пів години, а внутрішню заливається свиню відваром кмину, або настоем румянку. (Настій робиться так: заливається румянок киплячою водою і лишається, аж натягне). До відвару дається перший раз 200 грамів соли глянберської. Коли звірина приходить до здоров'я — дається по трехи легкостварний корм.

Лизуха — це хвороба рогатої худоби, особливо нападають на неї тільки корови. Об'являється так, що худоба не має апетиту і лизиво пережовує. Хора худобина їсть радше забруджену казом солому, ніж чисту пашу, не забруджену воду, а навіть гноївку, їсть вибузлу на гною траву і радше їсть галузя дерев ніж траву на пасовищу, облизує всі річи, які лише стріє, їсть глину зі стіни, пісок, гниле дерево, мотузи і т. д. Причини сеї хвороби є невідповідний корм, у якому брак вапняних і фосфорових солей. Такій хворій худобі треба давати до їди зерна і соли. Так само поїти соленою водою. А пасовищу треба навозити штучними погноями з вапняними і фосфоричними солями.

Нежит (катар) жовудка і кишків (запор і понос). Причини: холодний або гарячий корм, нагріт іншем покрити заморожена трава, гаряче пийло. — Діє: гниле, спліснїле сіно, гнилі буряки, а часом і здорова паша пошкодить і викличе катар жовудка, як що господар нагло переходить з сухого корму на траву і даєть худобі їстися свіжою їдою. Також тяжка робота сейчас по їді шкодить худобі й викликає катар жовудка.

При цій хворобі худоба втрачає охоту до їди, стоїть сумна з похилею головою, коні часто зивають, а рогата худоба перестає пережувати (румжати). З жовудка відбиваються неприємні киси. Ліва сторона жовудка вздута. Болонки слизові з початку сухі, бліді або жовтаві, після покриттяються густим липким слизом. Дамі приходить запір, кал відходить твердими грудками і є оббитий слизом, знаходиться в ньому багато нестравленої паші, особливо зерна. З часом запор переходить в розвільнення поносу, ц. є. в нежит кишок. Худоба виділяє водянистий, кисловонючий кал: при цьому помітно худіє.

Худобу хору на катар жовудка і кишків лічитьсся в той спосіб, що треба їй давати легкостварну їду, як трава, м'яке сіно, поселені пішла з мукою або отрубями і відстояла літня, поселена вода. Худобину треба телю накривати і натирати часто віхтями соломи. Зимую треба при сприяючій погоді ви-

водити худобу на прохід (але худоба має бути тепло накрита).

Часом вже при захованню дієти — худоба виздоровіє. Але краще є дати зразу худобі лік на очищення. І так: коням дається слід. лік: *Natrii sulfurici* 300 грамів, *Tartari stibialis* 6 грамів. Ці два ліки разом змішати, розпустити в 1 літрі теплої води і влити хорій худобині в рот. Молодим лоша́там дається той лік в меншій кількості. Рогатій худобі дається на очищення сіль глаберську, $1\frac{1}{2}$ кіля в 3 літрах теплої води розпушену. Коли хвороба повсталала внаслідок перепоєнення шлунка їдою, то дається рогатій худобі на очищення *Tartarus stibiatus* 10–20 гр. в 1 літрі води нараз. Як довго худобина не румеєє — не дається нічо їсти, лише соленої води до пиття. Чим довше худоба голодує, тим краще.

Нежит кишок і жолудка з часом, коли невилічиться, переходить в хронічний, довготривалий. Таку худобу треба лічити головню дієтою, т. є. давати легко-стравля їду, в малій кількості а головню давати багато соли. При запорі робити кнестуру з зимної води, з додатком до неї мила або соли. Коли розвільнення не уступає, дається пражений овес, а коням вливається раз в день розтвір креоліни. (Одна ложка креоліни на 1 літру води).

При поворогі до здоров'я — хоч худоба має охоту до їди, — не треба їй перепоєняти жолудка.

Запалення мозгу. Причини: удар в голову, велика спека, душна стайня, надмірний корм горохом, фасолею, житом, конюшиною, сильна простуда. У коней появляється запалення мозгу частіше, ніж у других звірят. Часом буває запалення мозгу при деяких заразливих хворобах, як при волзах. Ознаки хвороби: Сильне роздриження звіряти, а відтак оспалість, непритомність. Кінь скаче з задертою головою вперед, стає на задні ноги, перекидається, вдаряє головою об стіни і т. и. Опісля попадає в оспалу непритомність. Опирає голову остіну або на що попаде, очі сennі, стоячи, ставляє ноги навхрест або під себе, так, що часом тратить рівновагу. Горячка підноситься до 41 степенів. Кінь тратить чутливість, можна йому впахати палець в ухо, а він не реагує. Кінь не хоче їсти, або їсть несвідомо. Часом візьме жмут сіна і держить його цілими годинами в роті не жуєчи. Кал і моч відходять неправильно в деяких случаях виступає параліж одної або другої части тіла.

При запаленню мозгу треба худобу так лічити:

В самих початках роздраження пускається худобі кров (2—4 л. крові). Коли вже хвороба зайшла далі, т. є., коли вірина вже непритомна, кров пускати було вже шкідливо. Ставимо коня в холодну, темну і тиху стайню. Віддаляємо всі предмети, якими кінь міг би скалічитись. На голос

зимні оклади. Щоби вода скоро незагрівалась, додаємо до неї троха оцту і соли. Робиться зимну клістиру, т. є. вливається у відходову кишку 4—5 літрів води нараз. Кормити таку худобу треба тільки травою, бураками, морквою і добрими сіном. До пійла додавати глявберську сіль.

Оглух (колер) у коней. В тяжких випадках запалення мозгу у коней лишаються наслідки, а саме нова хвороба: оглух (колер), яка об'являється оспалістю звірини та більшою або меншою непритомністю. Це невеличима хвороба, яка літом підчас спеки усилюється, а зимою зменшається.

Ліків на сю хворобу нема. Можна лише облегчити сю хворобу, дбаючи, щоб стайня була провітрена (недушна), легкі страви і легка робота для такого коня.

Горячка — це не окрема якась хвороба, але звичайно головна ознака всіх запальних хвороб. Горячку мірється у худоби в той спосіб, що термометер, який для тої цілі купуємо в аптеці — вкладаємо на 10 хвиль до відходової кишки, а відтак по витягненню термометру відчитуємо висоту горячки. Внутрішня температура здорового дорослого звіряти виносить:

- у коней 37.2 до 38.5
- у волів і коров 37.5 до 39.09
- у овець 38.5 до 40.5
- у безрог 38.5 до 39.5

Чим молодша звірина, тим вища його температура тіла. Як що при горячці худоба має неправильний пульс, або серце б'ється неправильно, опускаючи деякі удари, то добре є дати худобі чорної кави або горілки (одна десята часть літри два—до три рази денно). З аптечних ліків добре є: Folia Digitalis 50.00 грамів змішати з мукою і зробити з того 8—10 рівних пігулок. Таку пігулку дається худобі раз в день, втискаючи її в горло, щоби хвора худобина її нежуючи проковтнула.

При запальних хворобах добра є слідуєча зміцняюча рецепта:

- $\frac{1}{2}$ фунта потовченого на порошок ялівцю,
- $\frac{1}{2}$ " утертого коріння татаряку,
- $\frac{1}{2}$ " " " червоної енцианни,
- $\frac{1}{2}$ " порошку з полину
- $\frac{1}{2}$ " соли (звичайної),
- $\frac{1}{2}$ " сіркового цвіту,
- $\frac{1}{2}$ " антимону, трохи меду і юшки з ялівця —

зробити з того всего масу і давати 3 рази денно по 10—12 дека на язык копісткою.

Катар носа і горла — це запалення болонки слизової носа і горла. Ліч ння: чистий і теплий воздух в стайні. Їда легко стравна як: пійло з струбами, м'яке сіно і трава. Добре є теж давати вдихувати хорій худобині пару з горячої

води. два-три рази денно, через пів години. До такого кн п'ятку додається кілька капель карболового квасу, креоліни або терпентинового олію. Можна також цвіт з сіна запарити і давати худобі в'юхувати сю пару. Щоби худоба лучше вдихувала сю пару — накривається голову худоби над цебриком — яким покривалом, (коцем або полетном).

Катар легких повстає завжди з причини простуди. З початку виступає горячка, худоба тратить апетит, віддих стає хрипливий. В початках лічиться хоробу так, як нежит горла. Внутрішню дається: *Amonii chlorati* 100 грамів, *Pulveris radicis Liquirillae* 200 гр. і *Natri chlorati crudi* 200'00 грамів. Змішати разом і три рази денно посилювати одною ложкою тої мішанини трохи змочений корм. Молоді звір'ята заливається відваром *Radicis Senegae* 15 до 20 грамів на чверть літри води, роспустивши в ній 2—3 грами *Amonii chlorati*, — по 2 столові ложки денно. В случаях застарілого катару легких додається до повищого ліку ще *Kalii iodati* 1—2 грами. Хорі звір'ята треба хоронити перед дальшою простудою і неуживати до тяжкої роботи. Стайні повинні бути чисті, воздух здоровий, корм легкостравний.

Запалення горла наступає теж від простуди. З початку виглядає та хороба так, як катар горла. Худоба з причини болю горла не може проглотити їди і випускає її з рота, так само вода при поєнню вертає ноздрями. Кашель з початку сухий, відтак вогий. З носа тече жовто-білява теч. До запалення горла прилучуються ще так зв. з. о. л. з. и, а чашто ще біля горла показується пухлина.

Лічити треба так: обвивається горло коциком, худобині дається вдихувати пару (як при катарі). Коли нема пухлини, то натирається підгорля олієм терпентиновим. Коли є пухлина, те робиться худобі оклади з 5% карболової води, а до окропу для вдихування пари додається соли або алуноу. При більших комплікаціях лучше є завізвати ветеринаря.

Запалення легких. Причина: простуда і форсовна робота. З початку появляється сильна горячка, серце бється скоро, віддих короткий і худоба не їсть і стоїть з розширеними ногами. Кал сухий, слюзом екритий, худоба теж кашляє, сухим, коротким кашлем. Хороба до 6 днів змицнюється — і тоді наступає перелом, худоба або гине, або слабість пересильюється і до 14 днів худоба виздоровіє.

Спосіб лічення: в перших початках запалення від простуди, коли худоба добре віджилена, пускається їй кров. Неможна одначе пускати крови тоді, коли худоба заразилась тою хоробою. В перших днях, коли горячка йде вгору — обвивається грудну клітку намоченим в студений воді простиралом. Коли покажеться вогий кашель дається пігулки, по одній денно для старших звір'ят, а по половині для молодих: *Amonii chlorati* 40 грамів, *Pulv. bac. Juniperi* 150 грамів —

додати житної муки і зліпити 5 рівних пігулок — і по одній денно всувати глибоко в рот, щоб худоба проглотила.

Помагає також: Tartari subiatі 30 грамів давати одну ложечку на путию води і тою водою поїти худобу.

Врешті треба поступати так само, як при катарі легких.

Дихавиця — то невилічима хвороба, яка витворюється в наслідок застарілого катару або запалення легких. Часто дістає худоба дихавицю внаслідок тяжкої роботи. Головними ознаками тої хвороби є тяжкий віддих, худоба є нездала до роботи, — для того кожному прислугує право, коли таку худобу купить, віддати її продавцеві і відібрати свої гроші.

Зовнішні і шкірні хвороби у звірат.

Загальні замітки про рани. Рани бувають тяті, різані, проколоті і від ударів (згнетень). На всякі рани найліпше є давати оклади води з оцтом. Чисте подотенце змочити у воді з оцтом і часто до рани прикладати. Коли рана застаріла — треба перше обмити водою з милом, а потім теплим оцтом. Коли рана кєрвавить, треба затамувати кров прадивом намоченим в оцті.

Коли рана на нозі — запровадити коня у воду на і годину і вимити оцтом. Коли рана товчена (згнетення) — прикладається глиною розмоченою у воді з оцтом. Коли рана опухне — смарувати комфоровим спіртом і терпентиновим олієм. Добре є також робити при пухлині оклади з напки зробленої з 1/2 кварти опиханого сімени лняного, завареного в 2 квартах води. (Такий оклад помагає також при пухлині вимени, так у кобил, як і коров).

Види — струпи нашімні. На шкірі появляється гудзок, покритий парпями і найженою шерстю. З часом гудзок пухає і теч зліплює шерсть — а коли почне ропіти і зіллється два — три струпки разом, то витворюється на шкірі одна роляча рана. З часом струп разом з шерстю відпадає і лишається на шкірі голе місце. Причиною тої хвороби є нечистота шкіри і запалення шкіри викликане кусанням блох, вошей, тертям упряжи і т. п.

В початках лічиться сю хворобу слідующею мастиою: Steolini 5 грамів, Ungvetum Zinci 100 gr. Разом змішати і мастити струпи. Коли хвороба за давнена, то мастити мастиою: 100 грамів Pic liqid, 100 gr. Sapon Kalin., 50 грам. Spirit. vini. Разом змішати і мастити струпи, але треба раніш остригти шерсть довкола струпа. Хвороба ця тримається довго у дом. звірат, коли вони живуть в нечистоті. Але, як держимо звірину в чистоті, то хвороба скоро уступає. Найчастійше появляється та хвороба у псів і коней, у рогатої худоби рідко коли.

Стригучий лишай — є заразливий, дістається через грибки-бакцилі від одної худоби, до другої. Найчастійше достають цей лишай воли, корови і телята. Пізнати по тім, що на шкірі випадає шерсть, а гола поверхність покрита парплями або білявою коростою. У рогатой худоби появляються лишай на голові і шиї, у коней на хребті.

Хору худобу треба відділити від здорової, щоб зараза не ширилась. Лишай змивати милом і теплою водою і мастити 2—3 рази денно креоліною мастію (5 грамів креоліні на 50 грамів масла).

Груда у коней — є то запалення шкіри і екцем в задній частині пута. Коли занедбається сю хворобу то витворюються глибокі щілини, струпи і рани довкола цілого пута. Лічення: очистити груду водою і милом і смарувати мастею, зробленою з слід ліків: Ungventum Zinci 100 грамів і Креоліні angl. 5 грамів. При глибоких ранах засипувати порошком Jodoformii 10 грам. Acidi borici 20 грам. Опісля перев'язується ногу ватю і полотном (бандажем). Перев'язку що дня змінити при чому треба рани ватю (не водою) легко очистити.

Кордюк — рана на язиді повстає в наслідок зранення язика гострими травами як осет, будяки, або ячмінною половиною. Язик часом так покалічений, що худоба не може їсти. Лічення відбувається так: обережно витягається язик з рота і сполікується при помочи сикавки — креоліною водою (на 1 літру води — 1 ложка креоліні.) Кормити худобу тоді лише мягким кормом (трава і пійло з муки і отруб).

Хвороби копит у коней. Часом внаслідок злого підкуття повстають рани на вінку копита або цвях дістається за глибоко і кінь хромає. В таких випадках треба скоро прийти коневі з підмогою, бо коли занедбаєм сю хромоту, то відтак хвороба довго триває, а часом буває і невилічимою. При зраненні вінка копита треба вистаючі частини легко відрізати і вимити копито креоліною водою, та забандажувати аптичною газою і ватю. При загводженню копита треба сейчас підкову відняти і копито купати в креоліновій воді. Коли копито горяче — давати оклади з холодної води. Підкову прибавати аж тоді, коли кінь перестає хромати, але не вбивати гвоздя в те саме місце, де було раніш загводжено. Взагалі всякі ушкодження копита треба старанно лічити і слідкувати, щоб кінь не хромав. В кождім случаю — помагає тут чистота, зливання креоліною і перев'язки (оклади).

Запалення очей — повстає з нечистоти, як щось звірині впаде в око тощо. З початку худоба слезить, прижмує око, з часом появляється на повіках пухлина. Треба перш за все очистити повіку боровою водою (ложка Acidi borici на $\frac{1}{2}$ літри води). Опісля робиться оклади з холодної води, а до ока — запускається чистим гусячим перцем слід. плин: Collyrii adstring. lut. 20 грамів, Aquae destil 20 грамів.

Загальні замітки.

Кожду хворобу помагає лічити чистота, для того треба худобу держати в чистих стаїнях, дбати про чисте повітря і тепло. Кождий господар повинен мати дома під рукою деякі ліки потрібні при ліченню худоби. Перш за все повинні бути дома: Сіль глянберська (*Natrium Sulfuricum*) 1 кільо, *Tartarus stibiaticus*, 20 грамів, Олій рициновий. 1 фунт. Олій терпентиновий, $\frac{1}{4}$ літра, *Creolinum anglicum* 100 грамів, *Acidum boricum* (борова кислота) 100 грамів, *Jodoformium* 20 грамів.

Аптична чиста вата на рани

Всі ліки, яких самі не можемо зробити, купуємо в аптеці. Клістири — це вливання води у відходову кишку худоби. Робимо це при помочи сикавки або ірригатора — все те дістати можна в аптеках або дрогеріях. Коли хто не має такої сикавки, то добре є мати дома гумову рурку і тою руркою можна впускати во ду у відходову кишку в той спосіб: на дні ведра робимо дірку, до дірки прикріплюємо рурку дерев'яну а на сю рурку насаджуємо гумову піпку, яку другим кінцем впихаємо до відходової кишки. При піднесенню сосуда в гору вода піде руркою так сильно, як із сикавки.

Пігулки дається худобі: лвою рукою витягається язик, а правою всувається пігулку в горло. При цьому підноситься худобі голову в гору і тримається так довго, доки худоба не проглотить пігулку.

Коли вливаємо худобі лік в горло, добре є обвити шийку фляшки полотном, щоб в разі розбиття — худоба не зринула собі рота.

Ріжні ради.

Як охоронити худобу перед мухами, Перед вигнанням на пасовиско треба обмити або скропити худобу настойкою з полину, до якої добре є додати трохи оцту.

Коли корова зменшує при подою молоко, добре є давати 2 рази денно по 1 горсти такої мішанини по рівній часті порошку татараку, полину, ялівцевих ягід, кмину і соли. Коли соски попукають, смарувати несоленим маслом.

Кріваве молоко. Часом трапляється, що корова дає червоне мов кров молоко. Тоді треба так поступати: по пів фунта льняного олію і гіркої соли змішати і давати пити, або дати корові вивар з листя суніць зі солею. (Давати по 1 кварті нараз.) Коли корова дає сине молоко треба додавати до корму кмин, петрушку і сіль (по 2 жмені з кожного) — все те в порошку — давати 3 рази денно.

Коли ярмо попарить шию добре є мастити шкіру не-соленим маслом.

Пархи: змивається шкіру лугом а потім слід. плинсом: 4 фунти тютюну варити в 4 квартах води на протязі 1 години. Відтак відцідити, додати 1 ф. сірки, $\frac{1}{2}$ ф. поташу, і знова заварити, по охолодженню додати олію і мити цілу звірину.

Воши у худоби можна винишити, натираючи шкіру лняним олієм. Або: зварити 1 ф. тютюну в 4 л. води (пів години варити) додати 2 кв. горілки і мити цілу шкіру.

Глисти у свигей. Коли безрога їсть і все голодна, худіє і кашляє, то в неї є глисти. Мішати до корму відвар з полину і трохи соли.

(Всі повищі ради і вказівки взяті з підручників В. Устіяновича, о. Ф. Бебикевича та „Нар. Календаря, Ф. Дудка.)





Лічнічі зілля.

Уживані в недугах домашніх звірят.

Лічнічі зілля, яких уживаємо в різних недугах людей, є теж помічні і для хорих домашніх звірят.

Подаєм деякі зілля лічнічі, де ростуть, як виглядають, та на що худобі є помічні. (Хто бажавби зайнятися лікуванням худоби лічн. зіллям в ширшому розмірі, хай купить собі З. Кириловича: „Ветеринарний Зільник“, виданий „Трембітою“ в Коломиї; коштує зал. 1.)

Аниж, ганиш, бедрівець, плеканий по городах для насіння — ростина всім znana. Збирати в серпні і вересні. Має в собі квас бензоесовий, квас яблочний, залізо, гуму, цукор, живицю, а головню олійок анижевий. Уживається як напар, або спорошковане насіння. Дається коням 20 гр. худобі 40—80 гр., свиням 10—20 гр., як лік на скріплення кормового проводу і проти черевних корчів, на згонювання сечі і поту, зганяє здму та збільшує молочність. Для малих звірят дається олійок з оливою.

Афяни, чорниці, борівки, ростуть у наших лісах (головно гірських) цвітуть на весні і червні. Має цукор, вапняні соли, кваси горбовиновий і хіновий. Уживається напару з листків при ослабленню міхура сечового. Листки лічуть гнилизну устної ями, як що удається, щоб звіря тримало їх в роті.

Бзина чорна, бузина, бозник, цвіте в червні і липні. Листя збирається на весні, квіти в червні, ягоди, кору і коріння в осені. Вар із коріння є добрим ліком на водну пухлину. Дається коням і худобі 30—40 гр., свиням 5 гр., псам 2—4 гр.

Верба біла. Має живицю, гуму, саліцилевий квас. Кори з молодого галузя уживають проти пропасниці. Дешевий середник замість дорогої хінової кори. Дається: коням 15—20 гр., рогатій худобі 25—40 гр., вівцям і козам 5—8 гр.

Дуб. Вивар з миски молодих галузок, служить до положення в запаленню матиці, в запаленню по породі, при отроєннях, проносах. Жолудь з дуба, палену, вживають у прочоках, і при гнильцю у овець. Дається: коням 25 до 30 гр., худобі 30—50 гр., свиням і вівцям 8—10 гр., псам 3—5 гр.

Капуста. Оклади з квасної капусти при опаренню, стовченню, відмороженню дуже помічні. Листків з квасних крижівок уживають в окладах при запаленню вимен у коров.

Кміз польвий, кмінок. Ростає по лугах, пасовищах сіножатях та при дорогах. Уживається в кухні до страви. Усуває здуття і вітри і ділає проти кольок в животі, робить апетит (охоту до їжі), гонить міч, поправляє молочність, спинює зодму. Уживається яко порошок і запар. Дається: коням 15—25 гр., худобі 30—50 гр., свиням 5—10 гр., псам 2 гр. Також мочать насіння в горілці і подають коням в галочках.

Липа, напар з квіту уживають як лік проти кашлю, перестуди, кольок, горячки, а спорошкованого вугілля з липи проти зодми. Дається коням і худобі 25 до 40 гр., свиням 2—6 гр., Вар із листя гонить сеч.

Лодух, репій. Ростає дико по полях і городах. Цвіте в липні і серпні. Збирається в осени. Відвару уживають до переполікування ротової ями у худоби в часі прищипи. Запар з коріння чистить кров, викликає поти, трохи розвільнює.

Матопшик, медовник, ройник, мелісса. Плекають по городах для пчіл, декуди росте дико. Має запах меду, а смак гіркий. Уживають до окладів при запаленню вимен. Запар з листків зміцнює серце, покріплює, зміцнює шлунок і лагодить кольки. Дається: коням і худобі 30—50 гр., свиням 5—10 гр., псам 1—2 гр. Свіжі листки прикладають до повік, як очі болять. Коли пчола вжалить, додре натерти розтертим листком, устає біль і не пухне.

Морква. При золзах коней давати їсти. Покріплює ослаблений шлунок по недугах шлунка (як кольки). Також прикладають на боляки; тоді робиться теплі оклади з перетертої моркви.

Петрушка, гонить сеч і помагає при водяних опухах, зодмі, проти палапасів (вошей) у дробу. Робиться вивар з коріння; дається: коням 15—25 гр., худобі 30—50 гр., свиням 5—10 гр., псам 5 гр. Розтерте свіже бадилля петрушки прикладають при недугах залоз і при запаленню вимен.

Ріпак. Олій з ріпаку дають до гіркої (гявберської) соли. Служить проти кольок.

Спориш, споринь, намелець, омилок. Ростає на колосках жита, головню на пісковатих землях, найбільш в мокрих роках. Сушити в тіни, лічничу силу тратить по 9 місяцях. Є трійливий; в случаях затровення споришем, викликати воніти і дати пити чорну каву. Уживається коли по породі місце не відходить (за слабкі боли по породові) в порошок: кобилі 15 гр., корові 25 гр., вівці 3—6 гр., свині 3 гр.; можна подавати також з відваром полину.

Тютюн, який знаний кожному, бо так багато його курять. Відвар з тютюну служить на винищення вошей у всеї худоби.

Чіснок, знана городова ростина. Уживається при нежитях горішних частей віддихових. Саламаху з чіснику мішають з молоком і медом та подають пити. Також поправляє хіть до їжі і жене кишочні хробаки. Дається: коням і худобі 5—7 голівок; свиням 1 зубець; дробови $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ зубця.

Шалвія лікарська, росте в дикім стані, доходить до 80 см. в. Листя напротилежне, видовжене, на вершку з острым закінченням, боками зубчасте; горішна часть листків з мошком, і горошкувата. Цвіте в червні і липні квітом синьо-фіолетним. Листя з сильним запахом; смак гіркий. Має етеричний (летний) олійок, гірчичку, горбовину. Збирається листя і м'яккі вершки, заки появляється квіти. Свіже зілля розстелюється в тіни, на продуві, щоби скорс висохло, не стративши запаху. Переховувати в замкненім начинню. Жене сеч і вітри, стягає, ділає проти потів, проти гнилі, служить до переполікування ротової ямини при запаленнях слизниць (при прищипі), до переполікування матиці по породах, до складів на гнійні рани.

Дається до відварів: коням і худобі 60 гр., свиням і вівцям 20 гр., псам 10 гр. — беручи на 10 гр. склянку води.

Ялівець звичайний, яловець, жереп, можевельник, женіпер, росте по лісах, соняшних убочах, головню в горах. Цвіте в квітні дрібними китичками в кутах шпильок. Ягоди, спершу зелені, в осени темно-сині, м'ясисті, дозрівають лише в другім році. Уживається зрілих ягід, які збирається в осени, в зимі — як нема снігу, або весною. Зіспуті ягоди викидається і сушиться в тіни лише добрі.

В ветеринарії дуже вживаний. Уживається відвар, або олійок з ягід—жене сеч (прим. при коліці сечевій), але давати в малих кількостях, бо може викликати запалення нирок. Також можна ягоди дистилювати водою, поки не зійде запашний олійок, а тоді витяг (екстракт) з ягід добрий як напиток проти водної пухлини або задержки сечі. Олійок етеричний з ялівецю вживається до натирання при різних болях і ломан-

нях (гостець, поронення, зодма, корчі) уживаючи самий, або зі спиртом камфоровим, або амоняком.

До внутрішнього вжитку служить як напар, або самий, або з корінням кальмусовим. Дається: коням 15 гр., худобі 25—50 гр., вівцям 5 гр.



Хто має право говорити?

Оден чоловік, умираючи, прикликав до себе свої діти, — жінку, — свідків і розписує маєток.

— Ти Іване возьмеш за горою той кавалок, — а ти Горпина при долині...

Жінка перебиваючи: Знаєш старий, нехай буде на відворот: Горпина хай бере за горою, а Іван при долині.

— Та хай буде... ну тепер ти Петре дістаєш з мамою город по половині, а ти Гануська візьмеш сіножать.

— Е ні старий — знова перебиваючи говорить жінка, — хай Петро бере сіножать, а ми вже обі візьмемо город.

Вхопило це в люті умираючого і він ледви підносячися кричить:

— Замкни собі, жінко, писк, або ти вмираєш, або я?

О. Ц.

ЛЕГКО ПРАЦЮВАТИ І ЗАРОБЛЯТИ можемо лише тоді, коли в нас здорові руки і ноги. Коли нас щось ломить і коле, тоді працювати не можна. Проти всяких кольок і простуди найкращим і найуспішнішим ліком до натирання є Феллера — Elza fluid, який можна дістати в аптиці: Elza preparaty 660 A. Gutwiński, Bielsko, Rynek 15.

Читайте антиалькогольну літературу

У В-ві „РУСАЛКА“, Львів, Куркова 10 можна набути свід. антиалькогольні книжки:

Бабський бунт“ — оперета на 3 дії	зл. 1:20
Аламові сльози“ — жарт на 1 дію	” 0:60
Просвіта і п'янство“	” 0:60
Господарський Календар“ на 1930 р.	” 3:00

Тамже дістанете:

„Вітамінова кухня“ О. Заклинської — брош.	” 7.—
„Історія політичної економії“ проф. Шимоновича, яку кожда інтелігентна людина обов'язково мусить знати	” 8.—
„Гнів“, оповідання Ол. Бабія	” 3 —
„Безбожник“, жарт на 1 дію, О. Глуша	” 2—
„Старі гоїховодники“, трагікомедія	” 0:60
„Замотана справа“ жарт на 1 дію	” 1:20
„Сон під судний день“, комічна оперетка	” 0:60
„Плекання і лічення домашніх звірят“ (ветеринар. порадник)	” 1:60
„Коломийки“ Підкарпатської Русі—співаник	” 1:20
огчний Календар“ на 109 літ. наперед — (збірка віщувань)	” 0:50
Бесоди, приповідок і народніх звичаїв на всі дні року	” 1:20
з„Втеренарийний зільник“ — з ілюстраціями, (про лічничі	” 1 —
„Ілля, помічні у недугах худоби).	” 1 —
„Монограми“ до хрестикового вишивання — альбум з усіма	” 4.—
в'язаннями букв зл. 6,— Для шкільної молоді	” 2:50
„Медаліони“ з погруддям Б. Матері—на різбленій підставці	” 3.—
Медаліони з погруддям Шевченка і Франка на різб. дощинках	” 2:50
Портрети Шевченка і Франка по	” 10.—
Листівки з вірцями до вишивання, виробу килимів і герданів	” 10.—
Привіти на Різдво, Нов. Рік і Великдень на чудовогарних	” 10.—
кольорових листівках сотня по	

Домагайтеся укр. листівок по всіх кіосках, паперових складах і книгарнях.

Хто хоче причинитися до побороування п'янства — повинен поширювати наш „Господарський Календар“ на 1930 р., в якому є стаття проф. І. Челиги про шкідливість алькоголю для душі і тіла. Можна одержати сю працю в окремії книжочці за 60 гр.



3 0112 061740871

Умова з кождим, котрий купує календарі В-ва „Русалка“.

Зобов'язуємося прийняти від кожного, хто купить наші календарі безпосередньо у нас, прийняти кожду кількість непроданих календарів, коли ті будуть нам звернені до 15 січня 1930 року. Звернені календарі виміняєм на инший товар. Мимо тих зобов'язань даємо кождому від-продавцеві календарі з 33% рабатов, щоби кождий мав змогу заробити.

ВИДАВНИЦТВО „РУСАЛКА“ Львів, вул. Куркова 10.

ОПОВІСТКА!

Маємо на складі багато новинок в листівках,
(картках з видами).

Різдвяні карточки, 15 різних взорів. Зовсім нові, невидані листівки. Сотня зл. 10.—

Українсько-галицький театр, в 3 родах, гравюра (бронз. кольор), портрети артисток, з вишиваними, портрети артистів, Сотня зл. 6.—

Український театр, (арт. з Вел. України) з вишивками рамками. Сотня зл. 10.—

Українські типи, з Вел. України, мистецькі, гумористичні і т. п. Сотня зл. 12.—

Українські пісні в малюнках А. Ждахи. Сотня зл. 14.—

Українські гумористичні з віршами гум. Сотня зл. 11.—

Види Львова. Види Гребенова і Зелемянки. Сот. зл. 7.—

Види і типи Галичини. Сотня зл. 5.—

Привіт в день Ангела. Сотня зл. 5.—

Види Волині. Німецькі Різдвяні. Російське Художест. і т.д.

Портрети Шевченка великі по зл. 3.—

Медальйони з погруддям Шевченка і Франка по зл. 3-20

ПРИГАДКА!

Звертаємо увагу, що ніколи не оплатиться замовляти за післяплатою одну або дві книжки, бо тоді почта часом коштує два рази більше, ніж сама книжка. В таких ра-зах, коли хто хоче одну або дві книжки, яких вартість виносить ледви 1 до 2 зл., то найпрактичніше є посилати гроші з гори.

Хто замовляє одну книжочку за післяплатою, тому не висилаємо нічого,
бо шкода деревню викидати на почту кілька золоті!